

Voce conhece bem o Viagra ?

Viagra é um medicamento anti-impotência fabricado pela Pfizer com citrato de ingrediente ativo sildenafil para o tratamento da impotência masculina. Citrato Sildenafil relaxa os músculos e aumenta o fluxo sanguíneo em áreas específicas do corpo. A ingestão de Viagra aumenta a capacidade de atingir e manter a ereção por ser sexualmente estimulado. Homens que tomam Viagra relataram um desejo sexual ampliado, o aumento de força, e mais rápido recarregar. Viagra funciona em conjunto com a estimulação sexual para ajudar a alcançar a satisfação sexual máxima. No entanto, o Viagra não garante a proteção de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e Hepatite.

Como Viagra funciona?

Viagra permite que muitos homens com disfunção erétil de responder, estimula o sexual. Quando um homem está sexualmente excitado, as artérias do pênis a relaxar e ampliar, permitindo que mais sangue flua no pênis. Como as artérias do pênis se expandem e endurecem, as veias que normalmente levam o sangue ao pênis se comprimem, restringindo o fluxo de sangue para fora do pênis. Com mais sangue fluindo para dentro e menos que flui para fora, o pênis aumenta, resultando em uma ereção. É de notar que Viagra é um hormônio ou afrodisíaco, que só funciona quando um homem está sexualmente estimulado.

Viagra Dosagem

Viagra está disponível na forma de comprimido e para ser tomado por via oral. Idealmente, deve ser tomado quase uma hora antes da atividade sexual. No entanto, o Viagra pode ser tomada a qualquer momento a partir de 4 horas e 30 minutos antes da actividade sexual. Demora 30 - 45 minutos para mostrar efeito Viagra e esse efeito dura quase quatro horas. Se você tomar Viagra depois de uma refeição rica em gorduras (como fish & chips, cheeseburger ou batatas fritas), pode demorar um pouco mais para comer e trabalhar. Viagra deve ser tomado mais de uma vez por dia a menos que prescrito pelo seu médico.

Advertências / Precauções

É sempre aconselhável consultar o médico antes de iniciar a ingestão de Viagra. No caso de você ter a história de um ataque cardíaco, derrame, ou com risco de vida batimentos cardíacos irregulares nos últimos seis meses, ou com insuficiência cardíaca no passado, doença arterial coronariana, angina, pressão arterial alta ou baixa, problemas de fígado, problemas nos rins, problemas no sangue, incluindo anemia falciforme ou leucemia; um distúrbio de sangramento; úlcera do estômago; retinite pigmentosa (doença hereditária dos olhos); deformação do fêmur, como a doença de Peyronie, ou uma condição que pode levar a ereção prolongada e dolorosa, como um tumor da medula óssea, anemia falciforme ou leucemia, ou você estiver tomando qualquer outro medicamento contendo nitratos sua pressão sanguínea poderia de repente cair para um nível perigoso e pode arriscar sua vida. Todas essas condições, medicações e também alergia a sildenafil ou qualquer de seus ingredientes pode levar a resultados desastrosos. Por isso, é sempre aconselhável consultar o seu médico para ajustar as doses após a monitorização dos tratamentos listados acima.

Viagra é aprovada, recomendada para uso em mulheres. Assim, as mulheres devem tomar Viagra sob quaisquer circunstâncias. Também é recomendado para homens com mais de 65 anos a menos que tolera em pequenas doses para aqueles que são sensíveis aos efeitos do Viagra.

Dose faltado

Viagra genérico pode ser tomado como e quando necessário e existe o conceito de dose perdida.

Possíveis efeitos colaterais do Viagra

Todo medicamento tem algum efeito ou o outro lado e assim que faz Viagra. Depende de indivíduo para indivíduo e geralmente leve a moderada e duram mais do que algumas horas. A maioria destes efeitos secundários são evidentes com o consumo elevado de Viagra. Os efeitos colaterais mais comuns de Viagra são dores de cabeça, rubor da face, e indisposição. Também pode haver algumas alterações temporárias na visão de

cores (como problemas em distinguir entre objetos azul e verde ou ter um tom de cor azul para eles), tornando-se os olhos sensíveis à luz ou visão turva.

Mas se você sentir tonturas, náuseas, dores, dormência ou formigamento no peito, braços, pescoço ou maxilar durante o acto sexual, pare e chame o médico imediatamente. Você poderia ter um efeito colateral grave de Viagra, ou se tiver perda repentina de visão ou tem algum destes sinais de alergias como urticárias, dificuldade em respirar, inchaço do rosto, lábios, língua, garganta ou procurar ajuda médica de emergência imediatamente. Também aconselhamos parar de usar Viagra e chame o médico imediatamente se tiver qualquer um desses problemas sérios, como dor no peito ou sensação de peso, dor que se estende para o braço ou os ombros, náusea, sudorese, mal estar geral, batimento cardíaco irregular, inchaço na suas mãos, tornozelos ou pés; falta de ar e alterações na visão.

Em casos raros, os homens relataram uma ereção que dura muitas horas. Mas, se este for o caso, você deve chamar um médico imediatamente se a ereção dura mais de quatro horas. Se não for tratado imediatamente, dano permanente a seu pênis pode ocorrer. Ataques cardíacos, derrame, batimentos cardíacos irregulares, e da morte têm sido raramente relatadas em homens que tomam Viagra. Maioria, mas não todos, estes homens tinham problemas de coração antes de tomar este medicamento. Não podemos determinar se estes eventos estavam directamente relacionados com Viagra.

Sobre o Autor

Levando o saber e o conhecimento a todos.

Source: <http://www.artigoopt.com>